

# **RADIOLOGIE DES ORMEAUX**

**Radiologie Générale et Vasculaire – Scanner  
Mammographie - Echographie**

63, rue Denfert Rochereau – 76600 LE HAVRE

Tél. : 02.32.74.05.70 – 02.32.74.33.43

Fax : 02.32.74.05.79

Scanner Lignes directes : 02.32.74.05.75 – 02.32.74.33.45

**Docteur Laurent VERZAUX**  
**Docteur Philippe DE VANSSAY**  
Radiologues

## **MACROBIOPSIE MAMMAIRE**

Mme :

Votre rendez-vous est fixé le :----- à -----H-----

### **PRESCRIPTION A RETIRER EN PHARMACIE**

(à commander de préférence 48 H avant chez votre pharmacien)

- **1 XYLOCAINE ADRENALINEE injectable 1% (1 flacon)**
- **1 poche à perfusion SOUPLE NaCl 100 ml**

**Docteur Philippe DE VANSSAY**  
Le

**Docteur Laurent VERZAUX**  
Le

**PENSEZ A BIEN APPORTER LE PRODUIT LE JOUR DE L EXAMEN**  
**Ainsi que votre DERNIERE MAMMOGRAPHIE et/ou IRM mammaire**

**MERCI DE CONFIRMER VOTRE RDV 3 JOURS AVANT**  
**AU 02.32.74.05.70**

**TOUT RDV NON CONFIRME SERA ANNULE**

## **MACROBIOPSIE DU SEIN**

*Vous devez bénéficier d'une macrobiopsie mammaire sur une table dédiée.*

### **QUEL EST L'EXAMEN PROPOSE ?**

#### Principes et objectifs.

Une macrobiopsie du sein est un prélèvement guidé soit par échographie, soit sur une table dédiée de la lésion repérée sur vos examens radiologiques.  
Cette technique de prélèvement a été choisie en accord avec vos médecins car elle est la plus adaptée à votre cas. En fonction du résultat, une intervention chirurgicale pourra être proposée ultérieurement.

#### Organisation pratique de l'examen.

Lors de la consultation, le médecin vous explique le but et le déroulement de l'examen. Parfois, il est nécessaire de s'assurer que ce prélèvement est réalisable. Une simulation (bilan de faisabilité) est alors effectuée par le radiologue. Elle dure une vingtaine de minutes. Puis la secrétaire de l'Unité de Sénologie Interventionnelle vous communique par téléphone ou par courrier la date et l'heure du rendez-vous.

#### Comment vous préparer ?

Dans tous les cas, vous ne devez pas prendre d'aspirine les 10 jours précédant l'examen. Si vous prenez un traitement anti-coagulant ou antiagrégant plaquettaire, vous devez le signaler à votre médecin si vous ne l'avez pas déjà fait au cours de la consultation. Le cas échéant, votre traitement sera adapté par votre médecin traitant ou par un cardiologue.

#### Le jour de l'examen

Vous pouvez manger normalement. L'examen se déroule à **l'Unité de Sénologie Interventionnelle Service Radiologie CLINIQUE DES ORMEAUX**, 63 rue Denfert Rochereau.

#### Déroulement de l'examen

Vous êtes installée en position allongée, sur le ventre, quand la procédure est guidée sur table dédiée et sur le dos lorsqu'elle est guidée par échographie.

Dans le premier cas, la table d'examen comporte une ouverture dans laquelle on positionne votre sein. Une anesthésie locale est réalisée afin de rendre cet examen indolore. Le guidage de l'aiguille par radiographie ou échographie nécessite l'immobilité parfaite de votre sein car la précision des prélèvements est de l'ordre du millimètre. Parfois, un petit repère métallique est laissé en place pour marquer la zone prélevée. Ces prélèvements sont effectués par un radiologue. La durée de l'examen, y compris l'installation et la mammographie de contrôle est d'environ 1 heure.

.../...

.../...

### Après l'examen

Pour limiter le risque d'hématome, une compression de la région ponctionnée sera exercée avec une poche de froid puis un pansement compressif sera appliqué afin d'aider la cicatrisation. Il est nécessaire de garder ce pansement 2 à 4 jours sans le mouiller. Signalez-nous les éventuelles allergies au sparadrap et contactez-nous en cas d'intolérance au pansement.

Au bout de 4 jours vous pouvez retirer la bande autocollante puis décoller tout doucement les bandelettes de Stéristrip\*. Nettoyez ensuite avec précaution la peau à l'eau savonneuse, rincez puis séchez avec une serviette propre. Si la cicatrisation n'est pas parfaite, remplacer de nouvelles bandelettes de Stéristrip\* et recouvrez les avec un pansement Mépore\*. Gardez ce nouveau pansement pendant 2 à 3 jours sans le mouiller. En cas de douleurs, sauf contre-indication médicale, vous pouvez prendre du paracétamol (Doliprane\*, Efferalgan\*...). Ne prenez pas d'aspirine. Evitez les travaux ménagers, la pratique du sport et le port de charges lourdes pendant 48 h.

### Résultats

Les prélèvements font l'objet d'une préparation spécifique, puis sont examinés au microscope par le médecin pathologiste. Ils permettront de faire le diagnostic de votre lésion. Les résultats seront transmis à votre médecin prescripteur, et le radiologue vous communiquera par écrit ce résultat.

### **QUELS SONT LES RISQUES EVENTUELS ?**

Tout au long de l'examen, le radiologue et la manipulatrice restent près de vous pour vous expliquer la progression de l'examen. Des problèmes hémorragiques sont essentiellement rencontrés chez les patientes traitées par aspirine ou par anticoagulant d'où l'importance de signaler tout traitement à votre médecin.

Exceptionnellement, en cas de saignement abondant, un hématome peut se produire et nécessiter un drainage (très rarement sous anesthésie générale).

Des complications infectieuses sont tout à fait exceptionnelles, de même que les rétractions cutanées post-macrobiosie.

### **QUE FAIRE SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU EN CAS D'URGENCE**

Contactez le Service de Radiologie.

Si vous avez des questions concernant l'examen ou la surveillance de votre pansement :

De jour, entre 8 h 30 et 19 h 30 contactez l'Unité de Sénologie Interventionnelle

Tél : 02.32.74.05.70

De nuit et le week-end, contactez le Service des Urgences de la Clinique des Ormeaux

Tél : 02.32.74.32.75

.../...

.../...

Il est normal que vous vous posiez des questions sur l'examen que vous êtes amené à passer. Nous espérons y avoir répondu. N'hésitez pas à nous interroger à nouveau pour tout renseignement complémentaire.

Madame, Mademoiselle -----  
a personnellement rempli cette fiche le -----

et donne son accord pour que l'examen soit réalisé.

Signature :

**Radiologie des Ormeaux**

63 rue Denfert Rochereau  
76600 Le Havre

02.32.74.05.70

**RADIOLOGIE DES ORMEAUX**  
Radiologie générale et interventionnelle  
**Unité de Sénologie Interventionnelle**

63 rue Denfert Rochereau  
76600 LE HAVRE  
Tél : 02.32.74.05.70  
Fax : 02.32.74.05.79

**MACROBIOPSIE MAMMAIRE SUR TABLE DEDIEE**

**Recommandations après l'examen**

**QUELQUES CONSEILS APRES L'EXAMEN**

- En cas de douleurs après l'examen, **NE PRENEZ PAS D'ASPIRINE** ou de médicament contenant de l'aspirine. Vous pouvez prendre du paracétamol.  
Par exemple : DOLIPRANE\*, EFFERALGAN\* 6 comprimés de 500 mg par jour maximum pendant 48 heures.
- Evitez les travaux ménagers, la pratique du sport et le port de charges lourdes pendant 48 heures.
- Un bleu peut apparaître sur votre sein : ne vous inquiétez pas. Il s'estompera tout seul.  
Il peut se former également un hématome (une boule de sang). Il ne faut pas vous inquiéter, le plus souvent il se résorbera tout seul.
- En cas de saignement ou de douleur importante, contactez nous.  
*Conseil* : en attendant, mettez une poche de glace entourée d'une serviette et comprimez le sein.
- En cas d'allergie aux bandes autocollantes du pansement compressif (boutons, irritations devenant insupportables), vous pouvez enlever le pansement plus tôt que prévu et réalisez la procédure du 2<sup>ème</sup> pansement (cf « LE PANSEMENT »)  
Si après avoir retiré les bandelettes autocollantes, il vous reste de la colle sur la peau et que vous n'arrivez pas à la faire partir, vous pouvez demander à votre pharmacien de l'anti-adhésif.

**LE PANSEMENT**

- Vous repartez avec un pansement compressif que vous allez garder pendant 48 heures, sans le mouiller.
- Au bout de 4 jours, vous pouvez retirer la bande autocollante puis, sous votre douche, décoller tout doucement les bandelettes de Stéristrip\*.
- Nettoyez ensuite avec précaution la peau à l'eau savonneuse, rincez puis séchez avec une serviette propre.
- Au besoin remplacez de nouvelles bandelettes Stéristrip\* et recouvrez les avec un pansement Mèpore\*.
- Gardez le nouveau pansement pendant trois jours, sans le mouiller. Au bout des trois jours, vous pouvez retirer le pansement Mèpore\*.
- Vous n'avez plus rien à faire à la suite de ce pansement.

**SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU EN CAS D'URGENCE**

Contactez le Service de Radiologie.

Si vous avez des questions concernant l'examen ou la surveillance de votre pansement :

- De jour, entre 8 h 30 et 19 h 30 contactez l'Unité de Sénologie Interventionnelle  
Tél : 02.32.74.05.70
- De nuit et le week-end, contactez le Service des Urgences de la Clinique des Ormeaux  
Tél : 02.32.74.32.75